

## **Título**

Conductas Reiterativas Verbales: Taxonomía y Conceptualización.

## **Autores**

Sergio Vertedor <sup>1,2</sup>, Guadalupe Dávila <sup>1,2,3,4</sup>, Marcelo L. Berthier <sup>1,2,4</sup>

## **Filiación**

<sup>1</sup> Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia. Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (CIMES), Universidad de Málaga.

<sup>2</sup> Laboratorio de Investigación en la Neurociencia del Lenguaje (LINL). Facultad de Psicología y Logopedia. Universidad de Málaga.

<sup>3</sup> Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Facultad de Psicología y Logopedia. Universidad de Málaga.

<sup>4</sup> Ibima Plataforma Bionand. Málaga.

## **Palabras Clave**

Conducta reiterativa, ecolalia, estereotipia, perseveración, repetición.

## **Resumen**

### **Introducción:**

Numerosas taxonomías han sido propuestas para tratar de definir cada de las conductas reiterativas verbales (CRV) existentes en una amplia gama de condiciones neurológicas y psiquiátricas. Sin embargo, la confusión y el solapamiento conceptual entre ellas por clínicos y académicos ha venido siendo, desde hace más de tres décadas, un problema frecuentemente señalado en la literatura.

### **Objetivo:**

Operacionalizar para cada CRV su definición, tipo, correlatos cerebrales y cognitivos, aproximación terapéutica y patologías donde es más común su presencia.

### **Método:**

Se ha realizado una revisión bibliográfica mediante las bases de datos PubMed, PsycInfo, Scopus, y Web of Science. Además, se han revisado manualmente referencias bibliográficas citadas en los artículos y no listadas en las bases de datos consultadas. La propuesta de taxonomía fue establecida por consenso entre dos investigadores (SV y MLB).

**Resultados:**

Se han encontrado dos grandes grupos de CRV: aquellas donde se reitera la información auditiva escuchada de otro emisor —ecolalia, repetición e imitación verbal— y aquellas donde éste reitera su propia habla. Estas últimas se dividieron en: (1) *perseverativas* —perseveración y tics verbales, logoclonia, palilalia y tartamudez—, *estereotípicas* —estereotipia y automatismo verbales— y (3) *sucesivas* —aproximaciones semánticas, conduite d’approche y conduite d’écart.

**Conclusiones:**

La aportación de una nueva taxonomía sobre las CRV contribuye a relacionar mejor la fenomenología clínica con las posibles patologías y trastornos subyacentes (p. ej., palilalia → calcificación de los ganglios basales), siendo útil para mejorar la precisión diagnóstica que oriente al diagnóstico etiológico y tratamiento de cada CRV.